

SNAKE BITE - SADA NA HADÍ UŠTKNUTÍ

Postup záchrany

Poznámka: Při kousnutí jedovatým hadem postupuje jed naším krevním systémem. Pohyb těla zrychluje pohyb jedu tělem- proto je důležité, aby kousnutý člověk zachoval klid a lehl si.

Symptomy:

- dvě malé tečky na kůži po kousnutí
- pálivá bolest a místní otékání
- místo kolem kousnutí se zbarvuje do růžova až do zelena
- sucho v ústech

Léčba

Přes jakýkoli níže uvedený popis musí poškozený VŽDY vyhledat lékařskou pomoc v nejkratším možném čase!

1. Pokud máte u sebe vhodný protijed, aplikujte injekcí co nejdříve.
2. Pokud nemáte protijed, použijte svěrací /sací metodu popsanou níže:
 - a. Rozlomte v ruce antiseptickou ampulku, odstraňte papírový kryt a použijte nasycený tampón k vyčištění celé oblasti kousnutí a také skalpel z uhlíkové oceli.
 - b. Umístěte škrtidlo mezi ránu a srdce na vzdálenost 4 cm od rány směrem k srdci. Zatáhněte, dokud bude kůže promáčknutá. Zkontrolujte, že je puls nad i pod ránou. Škrtidlo brání šíření jedu po těle. Pokud je rána někde, kde nelze škrtidlo použít pokračujte podle následujícího kroku.
 - c. Proveďte řeznou ránu zhruba 3 – 6 mm dlouhou přes kousnutí. POZOR! Nikdy neprovádějte řez na prstech, patě nebo přes cévy!
 - d. Přiložte odsávací přísavku přes řez, přidržte přes ránu a přitlačte, poté pomalu povolte. Většina jedu by měla být odstraněna během jedné hodiny.
 - e. Každých deset minut, nebo v případě většího otoku, odstraňte přísavku na jednu minutu a poté aplikujte znovu, lze aplikovat trochu blíže srdci mimo otok.

Neužívejte alkohol či jiné podpůrné přípravky.

Alkohol zrychluje pohyb jedu v krvi.

I přesto, že úmrtnost hadím uštknutím je méně než 1% při léčbě rány, převoz do nemocnice by měl být proveden co nejdříve! Pokud oběť musí jít pěšky, je třeba jít co nejpomaleji s častými přestávkami.

Během pochodu aplikujte odsávání.

Nejedovatí hadi také mohou uštknout. Také uvidíte dvě stopy po hadích zubech. Rána by se také měla očistit, nejlépe vodou a mýdlem a sterilně zavázat. Lze aplikovat antibiotickou mast.

SNAKE BITE

Emergency Procedures

NOTE: Venom from a poisonous snake-bite travels through the lymph system. Motion will speed the flow — hence it is most important that the victim lay down and remain calm.

SYMPTOMS:

- Usually two small puncture marks in skin
- Burning pain and local swelling
- Area around bite discolours to purple or green
- Dry feeling in mouth.

TREATMENT:

Regardless of which First Aid procedure below is followed, the victim should be examined by a doctor as soon as possible.

1. If antivenin is available, it should be injected immediately.
2. If antivenin is not available, use the constrictor-suction method:
 - a. Crush the antiseptic ampule in your fingers, remove the cardboard cover and, using the saturated swab, clean the entire area of the bite and the scalpel blade.
 - b. Place the lymph constrictor around the limb between the bite and the heart within 1½" of the wound. Tighten only until the skin is dented. Insure there is a pulse above and below the wound. The intent is to merely retard the lymph flow. If constrictor cannot be applied due to location, simply

proceed with the balance of the treatment.

- c. Make 1/8 to 1/4" deep incisions over the fang marks. **CAUTION** — Never make an incision on fingers, toes, or over a visible blood vessel.
- d. Apply suction over incisions by squeezing the cup, placing it over the wound and then releasing. Most of the venom should be removed over a one hour period.
- e. Every 10 minutes, or as swelling spreads, loosen constrictor for 1 minute and reapply a little closer to the heart just beyond the swelling.

Do not administer alcohol or stimulants. Alcohol will speed the flow of the venom through the lymph system.

Although the fatality rate from snake-bite is less than 1% for a treated bite, transportation to a hospital should be done as soon as practical. If the victim must walk, movement should be slow, with frequent stops.

Continue to apply suction.

Non-poisonous snakes may also bite. In this case, you will usually see two U-shaped rows of fine tooth marks. The wound should be cleaned with mild soap and water and covered with a sterile dressing. An antibiotic ointment could also be applied if available.

Coghlan's Ltd.
Winnipeg, Canada